

pour l'Académie
de
chirurgie.

N^o. 40.


Mémoire

Et observations Sur la Cure des fistules Boreques
internes, récentes ala suite de Dépôts Simples
Et guéries par la Compression que peut Exercer
la plénitude de la vessie Secourue de la
Compression Supérieure.

Par Le ray Maître Chirurgien ancien
Professeur de l'Ecole pratique, Et Chirurgien
des Epidémies. a Couëron près Nantes
En Bretagne Ce 5 Mars
1784.

ARC 56 n^o 40





L'expérience démontre que les abscesses aux environs de
Lanus se terminent en suppuration bien plus promptement que
partout ailleurs. La même nous instruit de plus que quelque étendue
que l'on ait on a de la peine à saisir l'instant favorable pour en
faire l'ouverture. Si on les ouvre trop tôt, il arrivera ce qui arrive
aux autres abscesses ouverte avant leur maturité. Si on tarde de peur
d'aller fort loin on se fait jour par l'intestin. Les praticiens
ne sont pas toujours en matière de l'empêcher. Soit que le siège
du pus soit profond soit que le pus ait commencé par ronger
l'intestin avant de se manifester au dehors. Dans ces deux
circonstances le pus se fait jour par l'intestin. Les règles
de l'art établies disent qu'il faut rendre la fistule complète
et souvent est on même obligé de fendre l'intestin pour
parvenir à la cure qui est longue et douloureuse. Lorsque
l'abscess a été simple sans être trop étendu aux environs
et que le pus qui en sort par le rectum n'annonce pas
de vice les observations suivantes apprennent qu'on peut
tenter de le guérir par la simple compression.



Je suppose que le pus ait percé L'intestin entre Le
Sphincter de l'anus Et Le niveau du Col de la vesie Et que
Le pus étant d'une bonne qualité n'ait pas fusé trop loin
alors j'emploie La vesie pleine d'urine pour affaiblir
Le foyer de l'abcès étant secouru de la Compression
Superieure.

La vesie occupant La plus grande partie du petit bassin
Le trouvant pleine d'urine dans Le grand bassin Et si
Le Malade retient son uriner on peut le toucher avec Le doigt
par L'intestin rectum.

On juge quelle doit s'appliquer La partie Superieure du petit bassin
et quelle peut comprimer tous les points de sa Circonférence
En se pliant pour remplir les enfoncements des environs
Elle doit donc exercer une Compression douce, mole et égale
qui peut se Continuer Et se repéter plusieurs heures par jour
En augmentant Les boissons.

La vesie employée a propos peut donc Elle seule faire vaincre
La partie Superieure des abcès contenus dans le petit bassin,
d'en faire affaiblir La Cavité Et sander Le tissu Cellulaire
avec Mains de toute autre Compression. Lorsqu'on se décide
d'employer La Compression C'est lorsque Le tissu Cellulaire de la
Circonférence de l'abcès est dégorgé Et que le pus est d'une bonne
qualité.

Si le foyer est près de la peau et que la respiration ne puisse former une Compression suffisante
j'aiderai son effet par une Compression Externere
on Connait l'usage qu'il ya entre L'anus et
Le sphincter de L'anus la peau prête assez pour que
La Compression puisse avoir un effet suffisant
Laisant Le trou fistuleux libre pour le degorgement
du pus, et pour le detirger et nettoyer L'intestin
j'emploie des Lavements d'eau mielée.

Je n'emploierai pas l'autorité ni de forts raisonnements
pour appuyer ce que j'avance, isolé d'une Campagne
Bonne d'une Connoissance, je suis incapable de L'un
et de l'autre, mais pour prouver ce que je dis je ne
présenterai que des observations suivantes que j'ai fait
dans ma Pratique



1847

Received of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

La dernière observation qui m'a donné la première
idée d'employer la compression exercée par la plénitude
de la vessie pour vuider la partie du grand Bassin qui
est proche la vessie.

Un homme Martin âgé d'environ 25 ans alla
chute de Contusion sur le trochantère d'un fémur sous
l'appareil du fasciata dont le pur avait fait par
sous l'arcade Crurale au point de faire saillir la
région hypogastrique. Le pur comprimait tellement la vessie
que les urines ne pouvoient couler. j'eussais le fémur
à l'aide, et je vis deux courants de pur sortir
d'un delà Cuisse et d'autre du ventre. j'estime
qu'il sortit près d'une peinte de pur par sous
l'arcade Crurale; le pur en était blanc, ayant
peu d'odeur. j'introduisis le doigt par sous
l'arcade Crurale sans avoir pu reconnoître
l'étendue du foyer. je pratiquai une contreouverture



en milieu de L'apponevrose Du fessier late, Et
Dans Le Soir Le Cour de uriner fut plus libre
moins frequent, Et plus abondant. Comme
j'étois au pèré du Malade dans des Cas
à peu près semblable, Et qui étoit impossible
de faire tourner Le malade D'un Côté, il me
vint à l'idée d'employer La vessie pour Chasser
Le pur. Je recommandai au Malade de boire
Et de retenir de uriner Le plus longtemps qu'il
pourroit, Ce qui a réussi à faire Chasser Le pur
Et à Consolider Le tissu Cellulaire, tellement qu'en
moins de 18 jours Le pur a totalement cessé de
Couler par tout L'ariade Crurale Et Le malade
depuis Ce temps n'a Sentit aucune incommodité dans
Le bas ventre. La plaie de Laine a été cicatrisée
En un mois, mais La Contre ouverture du milieu
de la Cuisse a resté fistuleuse, qui a été ouverte & reformée
plusieurs fois, Et depuis j'ai perdu mon malade de vue
Voilà L'origine qui m'a donné l'idée d'employer la vessie
dans des Cas de fistules Bragues internes.

Deuxieme Observation qui prouve
l'efficacité de la Compression faite par la
fesse Et couvée d'une Compression extérieure dans
le traitement des abcès aux environs du rectum dont
le pus a pris son cours par l'intestin.



La veuve Berteche âgée d'environ 45 ans
se plaignoit d'une vive douleur aux fondements, Comme elle
avoit eu autrefois des hémorroïdes et qu'il y avoit eu suppression
on lui appliqua le sangsue. Le lendemain je
reconnus une tumeur à côté du fondement qui étoit accompagnée
de douleurs vives; on y appliqua des Cataplasmes émollients
Et à mon retour je sentis une fluctuation à côté du fondement
qui s'étendoit à près de trois pouces à la fesse
Elle ne pouvoit uriner ny aller à la selle.
Dans ce moment le hazard voulut que j'en fus
par d'instruments sur moi, et j'étois éloigné de mon
domicile. je ne pus retourner la voir que le lendemain

Deux la nuit Le pur s'étoit fait jour par
L'intestin, Et au deuxièmè elle avoit rendu près
d'une pinte de pur très fétide, mais d'Blanc.
Lorsque j'arrivai elle avoit dormi, urinoit facilement
Et ne sentoit aucune douleur; il ny avoit aucune
fluctuation, mais la dureté de la Circouferéne du foie
qui s'étendoit jusqu'à la fesse avoit encore lieu
il me vint à l'idée d'employer la Compression dans
Le Dessein que, si elle ne réussissoit pas, j'en viendrois
à L'opération, je fis employer des Cataplasmes Emollients
jusqu'au lendemain Et on lui donna des lavements
d'eau miellée. Le second jour après que le pur eut coulé
La dureté de la fesse avoit disparue, il ne
restoit qu'un engorgement depuis la fesse jusqu'à
L'anus. je lui fis continuer Les Lavements
Et je lui recommandai de Boire beaucoup
Et de retenir ses urines Le plus longtemps qu'elle pourroit.

Chaque fois quelle avoit envie d'uriner.
je commençai à lui appliquer des Compresses
de pulvériser sur la fesse que je m'approchai
de Lamer les jours suivants. Elle étoit contenue
par une Comresse quarrée on y avoit appliqué un lien
à Chaque Coin de la Maniere d'appliquer les Bandages
Et ainsi, comme; - je secondai la Compression par
un bandage double, lequel étoit, à bien raffiné
d'écarter puis que la fille se rapproche souvent
Et, plusieurs fois le jour. L'écoulement du pur a été
abondant par les Selles, Et les Laxements pendant
quatre jours le pur a diminué peu à peu Et j'ai eu
la Consolation de le voir totalement Cesser de Couler
En quinze jours, même que toute espèce d'inflammation
Et il y a déjà plusieurs années qu'elle ne rien restant.



Troisième observation ou la vessie pleine
a suffit pour guérir sans Compression Éternelle.

Le nommé Martin se sentant une vive douleur dans
l'intérieur du fondement. j'introduisis le doigt pour
reconnaître le siège de la douleur qui étoit à l'extrémité
du doigt, je ne doutai pas des raisons qu'il se formoit
un dépôt, je ne me trompai pas car il fut lui malgré
les saignées. L'inflammation se termina par suppuration
qui fut si abondante que douze heures avant que de guérir
il étoit pour par l'écoulement de la rétention d'urine. Et
à la première selle il en a rendu plus d'une demi chopine
comme le foyer étoit fort éloigné, et que j'avois beaucoup de
confiance en la compression exercée par la vessie. j'y dus recourir
et je n'ai par été trompé en y conduisant mon dépôt. je fis donner
vingt ou trois Lavements Emolliens dans l'espace de 48 heures
ou il a commencé Cuir d'un miclé j'ai lui recommander
de retenir ses urines pendant neuf ou dix jours après lesquels
il ne peut s'être boursé l'urine et depuis lors il n'a rien
ressenti.

Quatrième observation

il y a environ deux mois et demi que Monsieur Joliet
qui n'estoit pas encore trop guéri de la goutte eut une forte
douleur aux fondements qu'il prit pour une hémorroïde je
l'examinaï et reconus une dureté douloureuse à côté d'une
ancienne hémorroïde, Et comme il redoutoit la saignée je
me contentai d'y appliquer le sangsue sur le lieu de
la douleur. la grosseur augmenta pendant plusieurs jours.
je continuai d'y appliquer des Cataplasmes Emolliens. un jour
avant midy je sentis une fluctuation encore profonde en milieu
de la dureté, Et je lui annonçai que l'après midy j'en ferois
l'ouverture. a mon retour il me dit qu'il avoit environ
une heure qu'il ne sentoit plus de mal et qu'au moment où
la douleur avoit cessé il avoit senti tout à coup se
purifier dans le borsum. il vint une certaine
quantité de pur melleux avec un Lavement qu'il avoit pris
une demi heure avant que l'abcès fut perie a l'esperance
de son mal la fluctuation avoit disparue les bords
estloient encore un peu durs et au milieu on sentoit
un vuide. je fis mettre un Cataplasme Emollient pour
~~diminuer~~ la dureté, Et comme j'avois de la confiance
en la Compression, je ne parlai plus d'ouvrir.



Le Survenantien il Commence a prendre deux Lavements
D'eau ~~rose~~ mellee par jour. je lui recommandai de
Boire beaucoup et de retenir ses urines. j'appliquai
une pelote de linge trempé Liqueur et le lieu
qu'occupoit la dureté. les jours suivants j'augmentai
la pelote et je comprimai le lieu de la dureté en quel
ce continue environ douze jours et depuis ce temps
il n'a eu aucun ecoulement de pus ny autres incommodités
et je le Crois par faitement Guéri.

La premiere observation ou voit quelle a été
l'effet de la pteutic de la vespe pour faire sortir
Le pus Contre son propre poids Contenus dans le grand Bassin
du test qui de la maniere d'ager de la vespe pleine jointe a la
Compression de l'intestin ont été suffisants pour en assésier le
tissu Cellulaire on objectera peut être que de pus n'a pas remoulté
Contre son propre poids, je pourrais en convenir si le malade
n'est pas toujours resté couché sur le dos sans pouvoir se
tourner ny d'un côté ny de l'autre a cause d'un mal de la poitrine.
La deuxieme observation ou voit que pendant de peu
continue en route dans le grand Bassin jusqu'à près de la vespe
et l'autre portion de pus dans le tissu Cellulaire de la fosse

qui s'est fait jour par l'intestin. Le moyen
dont je me suis servis pour la Guérir a été la
Compression produite par la respiration qui a affaissé la
partie Supérieure du foye. Secondé de la Compression
Extérieure qui a affaissé la partie inférieure
pour produire cette Compression Extérieure j'ai
commencé par appliquer les Compresseurs gradués
sur la fesse en les rapprochant de jour en jour
de l'aîne. Ces deux Compressions auxiliaires
ont suffi pour consolider tout le foye de l'abscessé
Secondé de l'Evacuation détersion.

Sur la troisième observation la Compression
interne par la plénitude de la respiration jointe aux
Evacuations détersion ont suffi pour Guérir.

Sur la quatrième observation on sent que si
j'avois fait une ouverture Extérieure au moment que
le pus avoit percé l'intestin j'aurai produit une
Prostite Complète dont la Cure auroit été bien
plus douloureuse et plus longue.



C'est donc aux praticiens à juger de l'usage ou de l'opération et de l'utilité
de l'un ou de l'autre. On doit attendre que la nature se décide. Dans
le cas de la gêne même et même observation on se peut attendre
fait pour par l'intestin la compression a suffi pour guérir
Si on ne réussit pas toujours dans le cas semblable, je ne crois
pas qu'il y ait à craindre l'inconvénient de la tenter. Si on parvient
à éviter l'opération on épargne de cruelles douleurs
et si la compression n'a pas son effet, je ne vois pas
quelle augmente le mal puisque l'on a toujours le temps
de faire l'opération.

C'est encore aux praticiens à juger de l'usage ou de la compression
et de l'utilité et le temps de l'employer à propos. Il serait inutile
peut-être même dangereux de l'employer dans le cas ou le dépôt
serait ancien ou compliqué de la fonte du tissu cellulaire de
Callosité, gangrène de Corps étrangers, comme de l'urine
parcellée d'écoulement ou de vice dans les voies urinaires.
Le Chirurgien doit aussi veiller pour que le malade
ne retienne pas ses urines au point de causer l'atonie
de la vessie. Il suffit que la compression complète
de la vessie ait lieu plusieurs fois le jour.

Je Puis avoir suffisamment prouvé par ces
quatre observations le bon effet de la
plénitude de la respiration pour chasser le pur
du tissu Cellulaire, tant du grand Bassin
que du petit. C'est pourquoi ce que je me suis
proposé dans ce Mémoire



[Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]